

成
方
切
用

吳氏醫學述第四種成方切用目錄

卷十一上

嬰孩門

正方四十九
附方五

初生拭口法

甘草下胎毒法

豬乳法

襁褓

法乳哺法

乳兒法

哺兒法

雜將護法

柴歸飲

升麻葛根湯

方見表
散門

疏邪飲

柴葛
煎

參蘇

飲

方見表
裏門

惺惺散

透邪煎

麻黃湯

方見表
散門

加

味葛根湯

紅花湯
五味異功散

桔梗湯

羌活透肌湯

透肌

散

紫草化毒湯

搜毒煎

涼血養營煎

甘

桔湯

方見火門

消毒飲

加味如聖散

前胡化斑

湯

活血散

犀角地黃湯

方見血門

四順清涼飲

黃連解毒湯

方見火門

人參白虎湯

方見火門

七正

散

加味導赤散

辰砂益元散

方見退火回生散

當

歸黃連湯

保元湯

十二味異功散

九味異

功煎

六物煎

六氣煎

白朮茯苓澤瀉湯

補中益氣湯

方見氣門

四物湯

方見血門

當歸活血湯

內托散

八珍湯

方見氣門

附子理中湯

方見寒門

十全大補湯

方見氣門

止痛活血散

痧證初起方

吳氏醫學述第四種

武原吳儀洛遵程輯

門人

周蘭丸生庭
殷豫龍浩如
同較

成方切用

嬰孩門

小兒之病與大人無異。惟初生保護及痘疹等證。不得不另集方法。以便

施用。世俗所謂驚風。卽四時感冒證也。方中行。瘧書。喻嘉言。寓意草中。論之最詳。當從傷寒門。循經救治。切不可用抱龍丸。鎮驚丸。等金石藥。鎮墜外邪。深入臟腑。爲害不淺。

初生拭口法

嬰兒初生。急以綿裹指。拭兒口中

舌上惡血穢露。謂之玉銜。若啼聲一發。卽入腹

成百病

薛氏曰。嬰兒初生。口含血塊。啼聲一出。隨卽嚥下。而毒伏于命門。遇天行時氣。

久熱。或飲食停滯。或外感風寒。發熱等因。發爲瘡疹。急須於未啼時。用軟帛裹指。搥去其血。雖出痘亦輕矣。

又看舌下。若連舌有膜如石榴子。若

啼不出聲。不轉速以指爪摘斷之。或用葦刀子

割之。微有血出卽活。若舌下血出多者。以亂

髮燒灰。同豬脂少許和塗之。

聖惠云。看齒根有黃筋兩條。以葦刀

割斷。點豬乳佳。如兒口難開。先點豬乳。

甘草下胎毒法

用粉甘草中指一節拍碎。以水

二蜆殼煎一蜆殼。以綿纏蘸。令兒吮之。若吐出

惡汁為佳。若服一蜆殼，不吐即不須更服。不問

嬰兒虛實寒熱，皆須服之。

心鑑曰：古方書言嬰

朱砂白蜜黃連牛黃欲下胎毒。今人率承用之，不知今人稟受攝養與古不同。其藥乃傷脾敗陽之物。若與兒服，後必生異證。只宜用淡豆豉煎濃汁，與三五口，其毒自下。又能助養脾氣，消化乳食。薛氏預以甘草細切少許，臨產時以綿裹沸湯盪內，覆溫收生之際，以軟綿裹指蘸甘草汁拭其口，次用下胎毒諸法。

豬乳法

嬰兒初生至滿月內，常時時旋取豬乳

滴口中佳。

豬兒飲母次便提後，脾離乳急掙之，即得。

襁褓法

千金論云：小兒用父故衣，女用母故衣。

或方切月嬰

卷之三 豬乳法

襁褓法

勿使新綿切不可過厚恐令兒壯熱生瘡發癰

皆自此始

巢氏云兒始生肌膚未成不可煖衣

不見風日則令肌膚脆軟便易損傷見風日若

藏在幃幙之內重衣溫煖譬如陰地草木不見

風日軟脆不任風寒嬰兒皆當以故絮著衣

莫用新綿也天氣和煖無風之時令母常抱日

中嬉戲數見風日則令血和氣剛肌肉硬密堪

耐風寒不致疾病又當習薄衣之法當從秋

習之不可於春夏卒減其衣令兒受風寒冬

月但當著夾衣及衲衣之類極寒則漸加以舊

綿人家多愛子乃以綿衣過厚適所以爲害也

又當消息無令汗出汗出則致虛損便受風

寒晝夜寤寐皆當戒之

乳哺法

湯氏曰小兒乳哺須要得法乳者奶也

哺者食也。乳後不得便與食。哺後不得便與乳。

小兒脾胃怯弱。乳食相併。難以尅化。周歲以上。

必成乳癖于腹中。作疼作熱。疳病從此起也。丹

日。小兒腸胃尚脆而窄。若稠粘乾硬酸鹹甜辣。

一切魚肉水菓濕麪燒炙煨炒。俱是發熱難化。

之物。皆宜禁絕。只與熟菜白粥。非唯無病。且不

縱口。可以養德。此外生栗味鹹。乾柿性涼。可爲

長陰之助。然栗太補。柿太澁。俱爲難化。亦宜少

與。婦人無知。唯務姑息。畏其啼哭。無所不與。積

成痼疾。雖悔何及。所以富貴驕養。有子多病。迨

至成人。筋骨柔弱。有食則不能忌口。以自養。居

喪則不能食素。以盡禮。小節不謹。大義亦虧。可

不慎與。至于乳母。尤宜謹節。飲食下咽。乳汁便

通。情慾中動。乳脉便應。病氣到乳。汁必凝滯。兒

得此乳。疾病立至。不吐則瀉。不瘡則熱。或爲口

摩。或爲驚搐。或爲夜啼。或爲腹痛。病之初來。其溺必少。便須詢問。隨證治母。母安亦安。可消患於未形也。

乳兒法

凡乳母氣血爲乳汁也。五情善惡。悉氣血所生。宜戒喜怒。一切禁忌。不用狐臭。癭癭氣。嗽病者。及身體疥癬。頭瘡。髮少。脣緊。音啞耳聾。鼷鼻。癰病等。方可乳兒。夏天盛熱時。乳母浴後。或兒啼。不可與妳。使兒胃有熱毒。秋成赤白痢。浴後可令定息良久。乳之可無患也。聶氏曰。盛啼不可食乳。恐氣逆不順。聚而爲噎。亦能

成疾。千金論曰。凡乳兒不可過飽。飽則溢而
成嘔吐。若乳來多猛。取出授後。再乳切須乳時
合先令捏去宿熱乳。然後乳之。如乳母欲臥寐
當以臂枕之。令乳與兒頭平。母欲睡着時。即奪
其乳。恐其不知飽足。亦成嘔吐。父母交合之間
兒臥于側。或驚起。不可乳兒。蓋氣亂未定。必能
殺兒也。聖惠方云。醉淫喘乳能殺小兒。聖濟經
論乳者。夏不欲熱。熱則致吐逆。冬不欲
寒。寒則致下痢。母不欲怒。怒則令上氣顛狂。母
不欲醉。醉則令身熱腹滿。母方吐下而乳。則致
虛羸。母有積熱而乳。則變黃不能
食。新房而乳。則瘦悴交脛不能行。

哺兒法 錢乙云。兒多因愛惜過當。兩三歲猶未

飲食。致脾胃虛弱。平生多病。半年後宜煎陳米

稀粥。時時與之。十月後漸與稠粥爛飲。以助中

氣。自然易養。少病。惟忌生冷油膩甜物等。寶鑑云。兒

五十日可哺如棗核。百日彈丸。早晚二哺。三歲未滿。勿食雞肉及子。恐腹內生蟲。

雜將護法 嬰兒百日任脉生。能反復乳母當存

節喜怒。適其寒溫。嬰兒半晬。尻骨已成。乳母

當教兒學坐。嬰兒二百日外。掌骨成。乳母教

兒地上匍匐。嬰兒三百日。臍骨成。乳母教兒

獨立。嬰兒周晬。膝骨已成。乳母教兒行步。上件並是定法。世人不能如法。往往抱兒過時。損傷筋骨。切宜戒之。

柴歸飲。治痘疹初起發熱未退。無論是否痘是邪。

疑似之間。均宜用此平和養營之劑。以為先着。

有毒者可托。有邪者可散。實者不致助邪。虛者

不致損氣。凡陽明實熱邪盛者。宜升麻葛根湯。如無實邪。悉宜用此增減之。小兒

壯熱。呵欠頓悶。時發驚悸。或吐或瀉。手足時冷。面頰頰赤。嗽嚏者。為痘證也。呵欠頓悶。肝之證也。時發驚悸。心之證也。或吐或瀉。手足時冷者。脾之證也。頰赤。嗽嚏。肺之證也。腰痛。喜寐。腎之

證也。五臟之證盡顯者其痘必多。但顯一二證者其痘必少。其本總由于淫火之毒也。

當歸

錢二三

芍藥

或生或炒

荆芥

錢一

炙甘草

七分

錢

柴胡

錢一二

加薑煎服

血熱者

加生地

陰虛者加熟地

氣虛脉弱者

加人參

虛寒

者

者加炮姜肉桂

腹痛者

加木香砂仁

嘔惡

者

者加乾姜陳皮

若治麻疹

以乾葛易荆芥

升麻葛根湯

小兒初間發熱壯盛為風寒為痘

疹莫能辨的此方穩當

方見卷三上表散門

方見卷三上表散門

表熱壯盛。此邪實于表也。經曰：輕可去實。故用升麻葛根以疏表。甘草佐之，可以和在表之氣。芍藥佐之，可以和在表之營。去其實邪，和其營衛。風寒則解。痘疹則出。誠初間之良劑也。如至四五日，痘中夾疹者，亦此方主之。疹散只依常法治痘。

疎邪飲 治痘疹初起發熱。凡氣血強盛，無藉滋補者，單宜解邪。此方爲主，以代升麻葛根湯及蘇葛等方，最爲穩當。

芍藥

酒炒

柴胡

用倍

甘草

炙

蘇葉

荊芥穗

減半

水

煎熱服

無火者加生薑三片

火盛內熱者

加黃芩

渴者加乾葛

去蘇葉荊芥加乾葛黃芩連翹名柴葛煎治痘

疹表熱及瘟疫等證

參蘇飲

治痘證初起風寒壯熱體重頭痛痰嗽

壅盛

方見卷五下表裏門

風寒客于外故用紫蘇乾葛以發表痰嗽壅于

內故用半夏前胡桔梗陳皮茯苓以安裏邪去
之後。中外必虛。人參甘草急固其虛。此則表和
而痘易出裏和而氣不虛。表裏無失斯良劑矣。
惺惺散 發熱之初未明是痘形體怯弱者宜之。
人參 白朮 甘草 細辛 白茯苓 天花
粉 白芍藥 桔梗 各七分
參苓朮草防其虛也。細辛桔梗所以疏其陽。花
粉白芍所以和其陰。

透邪煎 凡麻疹初熱未出之時。惟恐誤藥故云

未出之先。不宜用藥。然解利得宜。則毒必易散。而勢自輕減。欲求妥當。當先用此方為主。

當歸

錢二三

芍藥

酒炒一錢

防風

八分

荊芥穗

錢一

升麻

三分甘草

炙七分

水煎服

如熱甚脉洪滑者加

柴胡一錢。此外凡有雜證。俱可隨宜加減。

麻黃湯

治痘疹天寒腠密表熱壯盛。

方見卷三上表散門。

解表之藥有三品。辛涼辛溫辛熱也。夏月表氣易泄。宜用辛涼。春秋表氣平調。宜用辛溫。若天

寒之時表氣閉密。辛涼辛溫不能解散。故以麻黃桂枝之辛熱者以主之。亦各當其可而已。佐以杏仁利其氣也。佐以甘草和其氣也。

加味葛根湯

凡小兒發熱看有痘情

耳冷指冷
脚冷眼如

含水。懶于
言笑。是也。宜用此服至見點

升麻

葛根

前胡

桔梗

山查

青皮

木通

荊芥

撫芎

甘草

加燈心

高鼓峯曰。如服此湯而不見點。是毒盛也。其證必重。若熱甚氣悶。譫語腰無力。冬月可加麻黃。

一錢夏月加石膏一錢甚者加至二錢如冬月熱甚過

四五日重證已見而舌灰白色者亦須以石膏合麻黃用之夏月蘇葉薄荷俱可進退用之

如見點如糠粃齊布熱甚口臭此脾經痘也死

不治矣去葛根青皮加紅花蟬脫名紅花湯三

後宜用如見點三日痘已齊而大熱不退此是毒

盛危候見矣須以涼藥涼血紅花湯去升麻撫

芩山查加生地丹皮與之然此是乾紅候百不

一活如熱微者不妨紅花湯去升麻撫芩山查木通加

殭蠶大力子名桔梗湯六日已過痘脚已齊又

三日發熱起頂。濃漿至矣。當用木通殭蠶荆芥
連翹花粉丹皮丹參等以和其毒。其有變白色
而發癢者。氣血虧也。五味異功散。見卷一上四
君子湯附方
加白芍以救其元氣虛甚者。參朮加至五六錢
大劑用之。自然有救。或泥于庸醫發未盡而禁
補。或反咎發表欠透。以致今日內陷者。此殺人
之論。不可信也。信手大補。不一二劑。必然窠下
漿來。生氣勃然矣。卽有擗搯破者。亦自循皮爛
臭而回生。

羌活透肌湯

治痘出見點未盡

羌活

陳皮

柴胡

前胡

半夏

茯苓

甘草

桔梗

川芎

當歸

山查

表氣未疏則出有不盡故用羌芎柴前以疏表裏氣未利則出有不速故用二陳桔梗以調裏當歸活表裏之血山查消表裏之滯血活滯消則痘之出也易易耳

透肌散

治氣弱痘出不盡

紫草

錢二

木通

錢五分

白芍藥

酒炒

人參

蟬脫

升

麻 甘草分五

人參甘草能益氣而補中。紫草木通能透肌而
起痘。升麻蟬脫能退熱而消風。用芍藥所以調
陰氣而和營衛也。

紫草化毒湯 治痘已出未出熱壅不快

紫草錢二 陳皮錢一 升麻 甘草分五 如小便赤加

木通

紫草活竅利血化毒。陳皮快膈消痰利氣。升麻
消風發散瘡瘍。甘草補虛和中解熱。木通加之

爲濕熱邪由溺而泄爾。

搜毒煎 解痘疹熱毒熾盛紫黑乾枯煩熱便結

純陽等證

紫草 地骨皮 牛蒡子 黃芩 木通 連

翹 蟬退 芍藥 水煎 渴者加花粉麥冬

陽明熱甚頭面牙齦腫痛者加石膏知母 大

腸乾結臍腹實脹者加大黃芒硝 血熱妄行

者加犀角童便 小水熱閉者加山梔車前子

兼表熱者加柴胡

涼血養營煎 治痘瘡血虛血熱色紅熱渴或色

燥不起及便結溺赤凡陽盛陰虛等證

生地 當歸 白芍 甘草 地骨皮 紫草

黃芩 紅花 水煎服量兒大小加減 渴

加天粉 肌熱無汗加柴胡 血熱毒不透者

加犀角 毒熱甚者加牛蒡子木通連翹之屬

甘桔湯 治痘疹咽喉腫痛

方見卷八下瀉火門

消毒飲 治痘疹咽喉腫痛膈上熱盛

或方切用 嬰 卷上 甘桔湯 消毒飲 加味如聖散 仁

牛蒡子

錢二

荆芥穗

錢一

防風

生甘草

分五

牛蒡子

疏喉

中風壅之痰

荆芥穗

清膈

間風壅

之熱生

甘草

緩喉

中風壅之氣

防風

散諸風

不

去之邪

加味如聖散

治痘疹痰嗽風熱聲啞喉痛

桔梗

錢二

牛蒡子

麥門冬

錢半

甘草

元參

荆

芥

錢一

防風

分七

生犀角

黃芩

分五

牛蒡子

麥門冬

療風痰而清肺熱

荆芥

防風散

風邪而升鬱熱

甘草

桔梗

黃芩

利咽喉而清氣

熱犀角元參涼心膈而療結熱熱去則金清金清則聲啞瘥矣

前胡化斑湯 治痘疹中夾斑淡紅色

其原由初間不能清熱解毒之故。治痘中之斑。與傷寒雜證不同。傷寒之斑。宜主寒涼。痘中之斑。寒之則血凝而痘不起。雜證之斑。間用溫補。痘中之斑。補之則血溢而斑愈盛。此方利便調衛。不寒不熱。誠得治痘斑之理也。

酒紅花 當歸錢一前胡八分荆芥四分白芷 甘草

節赤芍 陳皮五分鬱金七分胡荽子三十一粒

紅花當歸赤芍所以活斑中之血前胡白芷陳

皮荆芥所以利表裏之氣胡荽甘草鬱金所以散滯氣爾

活血散 治痘證氣血凝滯

木香

錢二

當歸尾

酒浸焙乾

赤芍

酒浸炒

川芎

紫草

酒紅花

錢五

血竭

錢一

每服三錢

氣貴利而不貴滯血貴活而不貴凝木香川芎

調其氣滯赤芍歸尾紫草紅花血竭理其血凝

尾角地黃湯

治痘疹血熱及諸失血證

方見卷一下理血門

心生血。生地黃所以涼心血。肝藏血。白芍藥所以和肝血。火能載血。牡丹皮所以去血中之火。熱能動血。生犀角所以解諸經之熱。

四順清涼飲

治實熱內壅。腹脹秘結。痘不能出。

大黃 當歸 芍藥 甘草

痘以熱而出。固不能以無熱。若實熱內壅。腹脹便秘。則三焦之氣不化。而痘不能以出矣。故用大黃通其滯。當歸活其血。芍藥養其陰。甘草調其胃。通利之後。表裏氣血皆承順矣。故曰四順。

如形質虛弱而大便秘結不堪攻下者用蜜煎

黃連解毒湯

治痘疹裏熱壅盛

方見卷八下瀉火門

無熱固不化毒。熱壅則毒亦不化。故用黃連瀉心火。黃芩瀉肺肝之火。黃柏瀉腎火。梔子瀉上下之火。無他證而惟熱壅。故用藥亦精專焉。

人參白虎湯

治痘證裏熱渴甚

方見卷八下瀉火門白虎湯附方

石膏清胃熱。胃清則不渴。人參知母甘草化氣

而生津液。液生則熱自除。

七正散

治痘證小便秘澁。

車前子

赤茯苓

山梔仁

生甘草梢

木

通

扁蓄

龍胆草

治痘必欲利小便者。水循其道而後地平。天成故也。是方也。車前能滑竅。赤苓能滲溼。木通能通滯。山梔能瀉火。草梢能通莖。扁蓄能利水。膽草能利熱。七物者。導其熱邪。正其中氣。故曰七正。

成方切用

卷五

七散加味等散 辰砂金散

古

加味導赤散 治痘疹小便黃赤口乾煩渴。

生地黃 人參 麥門冬 木通 甘草 竹

葉 燈心

內熱故用生地黃。小便黃赤故導以木通。竹葉燈心口乾煩渴故潤以麥冬。人參甘草乃氣化而津液自生也。

辰砂益元散 治痘疹裏熱小便黃赤神氣不清。

方見卷七上消暑門六一散附方

滑石清利六腑。甘草解熱調中。辰砂安神去怯。

去甘草滑石辰砂各一錢水飛過加冰片三厘
每用冷水調服一錢名退火回生散治痘證血
滯枯澁火炎則水乾是故枯澁用滑石辰砂導
去其熱此釜底抽薪之意入冰片者欲
其速達而無壅滯也

當歸黃連湯 治痘瘡毒盛灰白色不痒

當歸 黃連 丹皮 殭蠶 荆芥 牛蒡子

花粉 銀花 生地 加燈心

保元湯 自行起發至頂已起矣而因氣虛有陰

證者宜此

人參 黃耆 甘草 加生薑

氣虛頂陷者此方主之

汪機曰蕭山魏直著博愛心錄三卷言小兒痘

瘡惟有用順險逆三證順者為吉不用藥逆者為肉不必用藥唯險乃悔客之象當以藥轉危為安宜用保元湯加減主之此方原出東垣治慢驚土衰木旺之法今借而治痘以其內固營血外護衛氣陰助陰陽作為膿血其證雖異其理則同去白芍藥加生薑改名保元湯炙黃耆三錢人參二錢炙甘草一錢生薑一片永煎服之險證者初出圓暈乾紅少潤也將長光澤頂陷不起也繼出雖起慘色不明也藥行色灰不榮也藥足光潤不消也藥老溼潤不斂也結痂而胃弱內虛也痂落而口渴不食也痂後生癰毒也癰腫潰而斂遲也凡有諸證並宜此湯或加芳藟官桂糯米以助之嘉謨曰人參補中黃耆實表凡內傷脾胃發熱惡寒吐泄怠臥脹滿痞

寒神短脈微者當以人參爲君黃耆爲臣若表虛自汗亡陽潰瘍痘證陰瘡者當以黃耆爲君人參爲臣不可執一也

十二味異功散

治痘出不光澤不起脹根窠不

紅表虛痒塌

人參 豆蔻

白朮

當歸

丁香

肉桂

厚朴

陳皮

半夏

茯苓

附子

木香

中氣有餘氣血充滿則痘光澤起發根窠紅活表無痒塌之患中氣不足則表亦虛而諸證作矣是方也人參白朮茯苓當歸所以補胃附子

肉桂丁香豆蔻所以溫胃半夏木香陳皮厚朴

所以調胃胃陽明也陳氏云陽明主肌肉胃氣

充足則肌肉溫煖光澤起脹而無痒塌之患亦

見道之言也

如漿有不起頂不充滿而發痒窠殼脫落如梅花片下發瀉者虛甚

也五味異功散加黃耆木香者附子肉桂吳茱萸俱當用

九味異功煎 治痘瘡寒戰咬牙并治男婦陽氣

虛寒等證可代陳氏十二味異功散等方

人參

當歸

熟地

錢二三

黃耆

炙

乾薑

炮

製附

子錢一二

肉桂

錢一

甘草

炙七分

丁香

三五分

或一錢

右

量兒大小加減。用水一鍾半。煎七分。徐徐與服。如泄瀉腹痛。加肉苳蔻麩炒一錢。或白朮一二錢。

六物煎 治痘疹氣血不足。隨證加減用之。神効。

不可盡述。并治男婦氣血俱虛等證。

熟地

或用生地

甘草

炙

當歸

芍藥

俱隨宜加減

川芎

三

四

分不

人參

或有或無。隨虛隨實用。

宜多

之氣不虛者不宜用。

水煎服

如發熱不解。或痘未出之先。宜加柴胡以疎利。

或加防風佐之。

見點後痘不起發。或起而不

貫或貫而漿薄均宜單用此湯。或加糯米人乳
好酒肉桂以助營氣。紅紫血熱不退宜加紫
草或犀角。脾氣稍滯者宜加陳皮山查。胃
氣虛寒多嘔者加乾薑用炒或加丁香。腹痛兼
氣滯者加陳皮木香。表虛氣陷不起或多汗
者加黃耆。氣血俱虛未起未貫而先癢者加
肉桂白芷。元氣大虛寒戰咬牙泄瀉宜去芍
藥加黃耆附子乾薑肉桂。

六氣煎 治痘瘡氣虛痒塌倒陷寒戰咬牙并治

男婦陽氣虛寒等證

黃耆 肉桂 人參 白朮 當歸 甘草 炙

右咬咀水煎服 加減法照前六物煎

白朮茯苓澤瀉湯

治痘證水泡

中有實熱。膈有停水。淫熱外行。

初則痘色晶亮。頃則痘皆水泡矣。此乃水不能潤下。竈底燃薪。釜中發泡之義。

白朮 茯苓 澤瀉

白朮甘而燥能益土以防水土。茯苓甘而淡能益土以決防。澤瀉鹹而潤能潤下而利水。水利溼消泡自瘥矣。

補中益氣湯

治中氣虛弱。痘不起脹。

難經曰。氣主煦之。故

氣者。嗜長萬物者也。痘不起脹。氣之弱也。

方見卷一上治氣門

參耆朮草以補氣。升柴以升陽。當歸以活其營。

陳皮以利其氣。

四物湯

治痘證根淡血弱。

痘至五六日。氣尊血附之時。根腳淡為血

弱。故用當歸活血。川芎行血。熟地補血。芍藥斂血。

方見卷一下理血門

當歸活血湯

治痘瘡色紫色。枯用此涼血活血。

生地 當歸 川芎 赤芍 紅花 紫草
色紫爲血熱色枯爲血滯熱者涼之枯者澤之
調血之道也生地涼血之品餘藥皆活血之品
血涼而活壅熱可除矣

內托散

治表虛裏實氣血皆弱

在表者痘頂灰陷爲氣虛痘根

色淡爲血虛若息重氣粗則爲裏實

人參

黃耆

甘草

當歸

川芎

白芍

厚朴

防風

白芷

肉桂

木香

桔梗

紅深黑陷屬熱毒者去桂加紫草紅花黃芩

淡白灰陷屬虛寒者加丁香溫裏肉桂溫表
當貫膿而不貫膿者倍參耆當歸加糯米煎熟
入人乳好酒

氣虛故用參耆甘草血虛故用歸芍川芎然防
風白芷肉桂能引諸藥自內而托之于外木香
桔梗厚朴能調壅實以歸于和

八珍湯

治氣血兩虛

醫貴未然之防痘證雖順若氣體虛弱不補恐有後

失故用四君以補氣四物以養血

方見卷一上治氣門四君子湯附方

附子理中湯

治胃中虛寒或又誤服涼藥瀉而

手足厥冷者

方見卷六下祛寒門理中湯附方

十全大補湯

治痘證十日以上血氣虛弱者

方見卷一上治氣門四君子湯附方

止痛活血散

治痘漿已滿血滯瘀痛不可忍者

白芍藥

酒炒二錢

爲細末酒調下

諸病痒者爲虛痛者爲實痒宜補而痛宜瀉此痛爲血實而滯故用芍藥以平血酒調以行滯

治痘瘡溼爛方

或以敗草灰敷之或以蠶繭灰入枯礬少許敷之或以牆上白螺螄殼燒灰敷之或以蛤粉敷之四法者皆是溼者燥之之意

痧證初起方

升麻 葛根 芍藥 甘草 桑皮 地骨皮

桔梗 牛蒡 荊芥 連翹

痧證卽疹子又名瘡子不宜依證施治惟當治本本者手太陰足陽明兩經之邪熱也解其邪

熱則諸證自退矣。若服前藥次日標形顴鼻

見點多者最吉。以其清陽喜上升也。第二日葛

根可去。惡其開肌腠而乾津液也。若熱甚勢重

前湯加白虎芩粉之類。斷不可少。若服藥後而

熱愈甚者。正毒達之故也。得大汗而毒自解矣。

若略見標而不見形者。此為痧毒不透。後必防

疳。宜從養陰治。甘露飲主之。見潤必多服。乃效。

亦從汗解。乃屢驗者。有一等小兒乳疳。一日可

以清火為主。兼解可也。緣小兒稟質尙弱。神氣有限。如遇粗工不審虛實。發散過多。必致正氣

虛脫而不可救者多矣。有痧毒痰喘甚者。雖用石膏黃連。如水淋石。要知是痧毒痰火壅結上焦之故。宜用瓜蒌霜枳殼花粉金沸草清痰清火。如挾氣虛者。加人參立應。痧證多泄瀉。慎勿止瀉。惟用升麻葛根黃連甘草。則瀉自止。痧家不忌泄瀉。瀉則陽明邪熱得解。是亦表裏分消之義。痧後泄瀉及便膿血皆由邪熱內陷故也。大忌止瀉。惟宜升散。仍用升麻葛根湯加黃連扁豆若便膿血加滑石末必愈。

吳氏醫學述第四種成方切用目錄

卷十一下

癰瘍門

正方二十六
附方七

皂莢丸

皂莢丸

桔梗杏仁煎

腸癰秘方

金銀花

酒

同毒金銀花酒
長春藥酒

四仙飲
金銀花膏

真人活命飲

托裏

散

芍藥蒺藜煎

當歸蒺藜煎

灸法

芙蓉

外敷法

見本草從新卷
三下木芙蓉條

百草煎

蠟礬丸

雄礬丸

托

裏十補散

托裏散

托裏溫中散

托裏黃耆湯

蟬

蛸散

槐花蕊

棉花瘡點藥

又武定侯方

當歸補血湯加防風連翹方 十全大補湯方見治氣

門

連翹金貝煎 連翹歸尾煎 降癰散 後方

止痛當歸湯

吳氏醫學述第四種

武原吳儀洛遵程輯

門人

周蘭九生庭
殷豫龍浩如
同較

成方切用

癰瘍門

外科方證。至為繁多。不能盡錄。茲量

血托裏之劑。多散見於諸門。唯在用者之圖
神而巳。○內經曰。營氣不從。逆於肉理。乃生
癰腫。又曰。諸痛癢瘡。皆屬心火。丹溪曰。癰疽
皆因陰陽相滯而生。蓋營行脈中。衛行脈外。
相並周流。寒與溼搏之。則凝滯而行遲。為不
及。熱與火搏之。則沸騰而行速。為太過。氣得
邪而鬱。津液稠粘。為痰。為飲。積久滲入脈中。
血為之濁。此陰滯於陽也。血得邪而鬱。隧道

阻滯。或溢或結。積久滲出脈外。氣為之亂。此陽滯於陰也。百病皆由於此。不止癰疽為然。

皂莢丸

金匱

治肺癰欬逆上氣時時唾濁但坐不

眠。肺者五臟之華蓋。處於胸中。主氣。候在皮毛。出惡風。咳嗽短氣。鼻塞項強。胸膈脹滿。久久不出。瘥則成肺痿。風傷皮毛。熱傷血脈。風熱相搏。氣血稽留。蘊結於肺。則成肺癰。多吐涎沫。而無膿者。肺痿也。口乾喘滿。咽燥而渴。甚則四肢微腫。咳吐膿血。胸中隱痛者。肺癰也。痿為正氣虛。癰為邪氣實。

皂莢

刮去皮
莢酥炙

為朱蜜丸以棗膏和湯服三丸

喻嘉言曰。火熱之毒結聚於肺。表之裏之溫之清之。曾不少應。堅而不可攻者。令服此丸。庶幾

無堅不入。聿成洗蕩之功。不可以藥之微賤而少之也。

加蛤粉等分爲末。名皂蛤丸。每服二錢。酒下。治婦人風邪客於乳房。而成癰癤。此藥能導其乳出而自愈矣。

桔梗杏仁煎。治咳嗽吐膿痰。中帶血。或胸膈隱痛。將成肺癰者。此方爲第一。此桔梗湯之變方也。

桔梗 杏仁 甘草錢一 阿膠 麥冬 百合

金銀花 夏枯草 連翹錢二 貝母 紅藤錢三 枳

穀錢半

水煎食遠服

火盛兼渴者加天花粉

腸癰秘方

凡腸癰生於小肚角微腫而小腹隱

痛不止者若毒氣不散漸大內攻而潰則成大患急宜以此藥治之

先以紅藤一兩許以好酒二碗煎一碗午前一服醉臥一時午後用紫花地丁一兩許亦如前煎服服後痛必漸止爲效然後服末藥除根

蟬退

僵蠶

錢一

當歸

天龍

大黃

石蝎巴

草五老蜘蛛

錢二箇

捉放新瓦上以酒鍾蓋定外用火煨存性

爲末每

空心用酒調送一錢日逐漸服自消

金銀花酒

治一切癰疽惡瘡不問發在何處或

肺癰腸癰初起便服

奇效

癰疽之生始於喜怒

處之不節或金石草藥之發動寒暑燥淫之
調致陰陽不平而蘊結營衛凝滯而腐潰輕者
起於六腑浮達而為癰重者發于五藏沉滯而
為疽大抵實者為癰淺者為癰深則為疽矣
發于外者為背疽腦疽者鬚等疽發於內者為
肝癰肺癰腸肚等癰外證易識內證難現太陽
經虛從背而出少陽經虛從鬚而出陽
明經虛從髭而出督脈經虛從腦而出

金銀花

五兩乾者不
及生者力速

甘草兩

水二碗煎一碗

再入酒一碗

略煎分三服

一日一夜服盡

重者

日二劑服至大小腸通利則藥力到外以生者
爛搗酒調敷毒四圍

金銀花寒能清熱解毒甘能養血補虛爲癰瘡
聖藥甘草亦扶胃解毒之上劑也

金銀花

二兩

甘草

一兩

黃耆

四兩

酒一升重湯煮服名

回毒金銀花湯治痛瘍色變紫黑者又黃耆當

歸金銀花甘草大劑煎服名四仙飲治氣血俱

虛服之未成卽消已成卽潰已潰卽愈

附長春藥酒黃耆

十二兩蜜炙煎膏

大生地

六兩銅片切

金

銀花當歸

各四兩

甘草

去皮蜜炙兩半

地骨皮

甘草水洗二兩

廣

陳皮

去白一兩

用白糯米

二斗

做酒釀

一埕

將前藥

後六味

用綿包好

入埕內

隔湯煮

三炷香

將黃

耆膏

傾入

再煮

三炷香

將埕埋地下

三尺餘深

七日七夜

取起

濾清

聽用

此酒不特外科虛證極效

凡勞傷虛損服

之無不神效所以蘇州陸德敷家以此酒馳名于天下也

附金銀花膏

一名忍冬膏

四月採鮮花

搗汁熬膏

茶

酒任點服

養陰退陽

補虛療風

尤宜於火熱熾

盛之人

永無疔疽之患

審酒亦佳

花葉同功而花香尤勝

真人活命飲 治一切癰疽腫毒初起未潰者

金銀花錢五 陳皮去白 當歸酒洗錢半 防風七分 白芷 甘

草節 貝母 天花粉 乳香錢一 沒藥二味另碾候藥

下熟皂角刺五分 川山甲三片剉蛤粉炒去粉 好酒煎善飲

者多飲酒以行藥勢忌酸物鐵器藥皆忌鐵

金銀花散熱解毒癰瘡聖藥故以為君花粉清

痰降火白芷除溼祛風並能排膿消腫當歸和

陰而活血陳皮燥溼而行氣防風瀉肺疏肝貝

母利痰散結甘草化毒和中故以為臣乳香調

氣托裏護心。能使毒氣外出不致內攻沒藥散瘀消腫定痛。

故以為佐。穿山甲善走能散。皂角刺辛散剽銳。

皆厥陰陽明正藥。能貫穿經絡直達病所而潰。

壅破堅。故以為使。加酒者欲其通行週身使無。

邪不散也。此藥當服于未潰之先未成者散已成者潰若已潰後不可服

托裏散 治一切惡瘡發背疔疽便毒始發脈弦

洪實數腫甚欲作膿者。脈弦洪實數乃實熱堅滿之證故宜下之

金銀花 當歸兩大黃 朴硝 花粉 連翹

牡蠣 皂角刺錢三黃芩 赤芍錢一 每五錢

半酒半水煎

金銀花清熱解毒癰瘡主藥。當歸赤芍調營血。
大黃芩硝蕩胃熱。黃芩清肺火。牡蠣軟堅痰連。
翹花粉散結排膿。角刺鋒銳直達病所而潰散。
之也。東垣曰。瘡瘍及諸病面赤。雖伏火熱毒禁。不得攻裏。為陽氣怫鬱。邪氣在經。宜發表。以去之。故曰。火鬱則發之。雖大便數日不見。宜多攻其表。以發散陽氣。少加潤燥藥。以潤之。如見風脈風證。只宜發表。風藥便可以通利大便。若止乾燥秘瀉。尤宜潤之。慎不可下。九竅不利。瘡瘍鬱。皆不可下。汗之則愈。綱目曰。大便秘實。不知其氣不降也。便以為實。而行大黃些少。寒熱不知其氣血不和也。便以為有外感。而行表散。如此害人最速。

芍藥蒺藜煎 治通身溼熱瘡疹及下部紅腫熱

痛諸瘡神効外以蜈蚣粉敷之

龍膽草 梔子 黃芩 木通 澤瀉錢半 芍藥

生地錢二 白蒺藜連刺搗碎五錢 甚者用一兩 如火不甚

者宜去龍膽草梔子加當歸茯苓米仁之屬

如溼毒盛者加土茯苓五錢或一二兩

當歸蒺藜煎 治癰疽瘡疹血氣不行邪毒不化

內無實熱而痛腫淋漓者悉宜用之此與芍藥

蒺藜煎相爲奇正也當酌其詳

當歸 熟地 芍藥酒炒 何首烏錢二 甘草炙 防風

川芎 白芷 荆芥穗錢一 白蒺藜炒搗碎三錢或五錢

或水或酒煎然水不如酒或以水煎服後飲酒

數杯以行藥力亦可 陽虛不能化毒者加桂

枝甚者再加乾薑附子 氣虛不化者加人參

黃耆 毒陷不能外達者加穿山甲或皂刺

灸法 治一切癰疽惡瘡

凡人初覺發背欲結未結赤腫焮痛以溼紙覆其上先乾處卽癰頭也取獨頭大蒜切片安于

頭上用艾灸之三壯換一蒜片痛者灸至不痛
不痛者灸至痛時方住最要早覺早灸爲上若
有十數頭者卽用蒜研作餅鋪頭上聚艾于餅
上燒之若初發赤腫一片中間有黃粟米頭子
便用獨蒜片安于頭上着艾灸十四或四十九
壯使毒氣外出則易愈李迅曰癰疽着灸勝于用藥三壯一易百壯爲率但頭頂已上切不可用恐引氣上更生大禍也史源曰有灸至八百壯者約艾一篩初壞肉不痛直灸至好肉方痛至夜火燄滿背高阜頭孔百數則毒外出否則內逼五臟而危矣綱目曰精要謂頭上發毒不得灸此言過矣頭爲諸陽所聚艾炷宜小壯數宜少小者如椒粒少者

三五壯而已。按東垣灸元好問腦疽以大艾炷如兩核許者灸至百壯始覺痛而痊由是推之則頭上發毒灸之痛者艾炷宜小壯數宜少若不痛者艾炷大壯數多亦無妨也。

芙蓉外敷法

見本草從新卷三下木芙蓉條

百草煎

治百般癰毒諸瘡損傷疼痛腐肉腫脹

或風寒溼氣畱聚走注疼痛等證無不奇効。

百草 凡田野山間者無論諸品皆可取用然

以山草爲勝辛香者佳冬月可用乾者

不及鮮者力速

須預爲採取之

右不論多少取以多煎濃湯

乘熱薰洗患處仍用布帛蘸熨良久務令藥氣

蒸透。然後敷貼他藥。每日二三次不拘。但以頻敷爲善。蓋其性之寒者。可以除熱。熱者可以散寒。香者。可以行氣。毒者。可以解毒。無所不用。亦無所不到。湯得藥氣。則湯氣無害。藥得湯氣。則藥力愈行。凡用百草以煎膏者。其義亦以此。此誠外科中最要最佳之法。亦傳之方外人者也。
若洗水鼓腫。每次須用二三十斤煎濃湯。二三鍋用大盆盛貯。以蓆簞遮風。薰洗良久。每日一二。次內服麻清飲。分利等劑。妙甚。

蠟礬丸 治一切瘡癰惡毒。先服此丸。護膜托裏。

使毒不攻心。或爲毒蟲蛇犬所傷。並宜服之。

黃蠟二兩。白礬一兩。

先將蠟溶化。候少冷。入礬和

勻。爲丸。酒下。每服十丸。二十丸。漸加至百丸。則有力。瘡愈後。服之亦佳。加雄黃名雄礬丸。治蠱毒蛇犬蟲咬毒。

心爲君主。不易受邪。凡患癰疽。及蛇犬所傷。毒上攻心。則命立傾矣。黃蠟甘溫。白礬酸澀。並能固膜護心。解毒定痛。托裏排膿。使毒氣不致內攻。故爲諸證所必用。

酒類黃明膠亦妙。方見本草從新黃明膠條下。

托裏十補散

局方即外科精要十宣散

治癰瘡初發或已發

邪高痛下瘡盛形羸脈無力者

癰疽不因膏梁丹毒火熱因虛

勞氣鬱者止宜補形氣調經脈自當消散不待汗之下之也

當歸

黃耆

人參

錢二

川芎

桂心

白芷

防風

厚朴

桔梗

甘草

錢一

每服二錢加

至六錢熱酒調下千金加芍藥連翹木香乳香

沒藥亦名托裏散治發背疔瘡

參耆補氣芎歸活血甘草解毒桂心白芷桔梗

枳殼厚朴瀉實滿防風散風邪為表裏氣血之

藥其成助陽內托之功也。丹溪曰。冬月腫瘍用

月潰瘍用之。以桂朴之溫散。佐以防風白芷。吾恐雖有參耆。難為倚仗。世人不分冬夏。無論經絡。不能無悞也。機要曰。治瘍須明托裏。疎通臟腑。調和營衛。三法。內之外者。其脈洪實。發熱煩躁。外無焮赤。痛深于內。其邪深矣。當疎通臟腑。以絕其源。外之內者。其脈浮數。焮腫在外。形證外顯。恐邪氣極而內行。當先托裏。內外之中者。外無焮惡之氣。內亦臟腑宣通。知其在此。當和營衛。用此三者。雖未即瘥。必無變證。

托裏溫中湯 治瘡瘍為寒變而內陷。膿出清解。

皮膚涼。心下痞滿。腸鳴切痛。大便微溏。食則解。

逆氣短呃逆。不得安臥。時發昏憤。此孫彥和治王伯祿臂瘍。

方也。六脈沉微。色變膚涼。加以呃逆。胃中虛寒。極矣。遂于盛夏用此大辛熱之劑。蓋拾時從證之變法也。

附子

炮四錢

乾薑

炮

羌活

錢三

茴香

丁香

沉香

益智仁

甘草

炙陳皮

錢一木香

錢半生薑

片五

衛生寶鑑曰。經云。寒淫于內。治以辛熱。佐以苦

溫。附子乾薑大辛熱。溫中外。發陽氣。自裏之表。

爲君。羌活味苦辛溫。透關節。炙草甘溫。補脾胃。

行經絡。通血脈。胃寒則嘔吐不下食。益智沉香

丁香大辛熱。以散寒邪爲佐。瘡氣內攻聚而爲

滿。木香。茴香。陳皮。辛苦溫。治痞散滿為使。

托裏黃耆湯

總錄

治諸瘡潰後膿多內虛潰後膿血出多

陰陽兩竭宜大補氣血。

黃耆 人參 當歸 桂心 茯苓 遠志

麥冬 五味子 等分為末每服五錢食遠服

人參黃耆補氣固衛當歸桂心活血生肌茯苓

滲溼健脾麥冬清熱補肺遠志辛散專理癰疽

五味酸溫善收腫大丹溪曰癰疽潰後補氣血

月半年之後虛證仍見轉成他病矣。

螻蛄散

治溼熱破爛毒水淋漓等瘡或下部賢

囊足股腫痛下部諸瘡無不神效

海螵蛸

不必浸淡

人中白

或人中黃礱砂亦可等分

爲細末先

以百草濃煎湯乘熱薰洗後以此藥溲之如乾者以麻油或熬熱豬油或蜜水調塗之若腫而痛甚者加冰片少許更妙若溼瘡膿水甚者加蜜陀僧等分或煨過官粉亦可

槐花蒞

治楊梅下疳神方

凡棉花毒或下疳初感或毒盛經久難愈用新

槐莢揀淨不必炒每食前用清酒送下三錢許
早午晚每日三服之服至二三升則熱毒盡去
可免終身餘毒之患亦無寒涼敗脾之慮此經
驗神方也

如不能飲即用藜水鹽湯俱可
送之但不及酒送之功捷也

棉花瘡點藥

杏仁

取霜真輕粉等分
爲末

敷瘡上二三日卽痂落

又武定侯方

雄黃

錢半杏仁三十粒
去皮尖輕粉錢一

爲末以雄豬膽

汁調敷之二三日卽愈天下第一方

當歸補血湯加防風連翹方 治瘡瘍有血無膿

搔癢不止有血無膿表氣不足也

當歸 防風 錢二 黃耆 錢五 連翹 錢二

當歸黃耆大補其氣血連翹解諸經之客熱防

風引歸耆直達于表二物得之而効愈速也此藥

服之數劑諸瘡化毒生膿膿滿毒盡則去病根而無溫癰之患○若膿日久不乾者去黃耆加

白朮茯苓以燥之如治爛痘之法則善矣

十全大補湯 治氣血虛弱頸面腹背皆瘡者瘡

生于手足者為輕生于頸面腹背者乃氣血虛羸之甚小人道長之象故宜大補

方見卷一上治氣門四君子湯附方

四君同黃耆以大補其氣四物同桂心以大補

其血氣血得其補則腹背之瘡先愈而君子道

長。小人道消矣。參苓白朮散亦可酌用。見補門

連翹金貝煎 治陽分癰毒或在臟腑胸乳肺膈

之間者此方最佳甚者速用數服無有不愈

金銀花 土貝母 蒲公英 夏枯草錢三紅藤

錢七八連翹五一兩或錢七好酒二碗煎一碗服服後

煖臥片時 火盛煩渴氣腫者加天花粉 若

陽毒內熱或在頭項之間者宜用水煎

連翹歸尾煎 治一切無名腫毒丹毒流注等最

宜用之

連翹

錢七八

歸尾

錢三

甘草

錢一

金銀花

紅藤

錢四五

好酒煎服如前

如邪熱火盛者加槐蕊二

三錢

降癰散

治癰疽諸毒消腫止痛散毒未成者即

消已成者斂毒速潰可愈若陽毒熾盛而疼痛
勢凶者先宜用此方其解毒散邪之功神効

若堅頑深固者。用後方。

薄荷葉

新者

茅根

野菊花

連根葉各一握

土貝母

減半

右薄荷野菊乾者可爲末。鮮者可搗爛。同貝母研勻。外將茅根煎濃湯去渣。用調前藥末。乘熱敷患處。仍畱前剩湯頓煖。不時潤於藥上。但不可用冷湯。冷則不散。不行反能爲痛。約敷半日。卽宜換之。真妙方也。

後方

凡疽毒堅頑深固。及結核痰滯。宜用此方。

生南星

土貝母

朴硝

等分

薄荷

倍用

石灰

風化者倍

用或再
倍用之

右同爲末用鹽酒杵稠粘敷患處經
宿乾則易之不必畱頭若膿成者畱頭亦可或
炒熱攤絹上隔絹貼之亦可或用麻油調或用
熱茅根湯調亦可若欲止痛速効加麝香或冰
片少許更妙

止痛當歸湯

總錄

治腦疽背疽穿潰疼痛

當歸

生地黃

芍藥

黃耆

人參

甘草

灸官桂

當歸生地活血涼血人參黃耆益氣補中官桂

解毒化膿

則毒化成膿

芍藥和脾酸以斂之甘草

扶胃甘以緩之

則痛自減矣

謂齊得之日世人皆

可住疼痛不知臨病制宜殊非一端熱痛涼之
寒痛溫之風痛除其風溼痛導其溼燥痛潤之
塞痛通之虛痛補之實痛瀉之膿鬱而閉者開
之惡肉敗潰者引之陰陽不和者調之經絡閉
澀者利之不可
執一而無權也